A supposer que *P. Ritsemai* Villard ne soit pas un synonyme de *P. petasifer* Fairm., ce qui me paraît improbable, il devra, tout au moins, être rapporté à la var. *Rosti* Pic (*L'Échange* [1913], n° 341, p. 135) qui a l'antériorité.

Communications.

Description de deux *Ochodaeus* et de deux *Orphnus* nouveaux d'Afrique. [Col. Scarabaeidae]

par E. Benderitter.

Ochodaeus congoensis, n. sp. — Long. 6 mill. Ferrugineux, brillant, dessous un peu jaunâtre, tète et corselet bruns. Mandibules brun-noir, fortes, très relevées sur les côtés. Épistome portant un petit tubercule médian près du bord antérieur, séparé du front par un sillon profond. Front fortement granuleux. Corselet à granules serrés, également répartis sur toute la surface, chaque granule donnant naissance à une soie courte, rigide, couchée ; un sillon longitudinal profond en arrière, effacé en avant. Écusson granuleux, une fois et demie aussi long que large, obtus à l'extrémité. Élytres à stries ponctuées ; inter-stries subconvexes, garnis de granules sétigères, les soies blondes, couchées, un peu plus courtes que celles du corselet ; angle apical droit ; carène du propygidium entière. Dents des tibias antérieurs grandes, aciculées.

Fort Crampel (Congo français). — Ma collection ; m'a été cédé par M. Le Moult.

Ochodaeus carinatus, n. sp. — Long. 5 mill. Entièrement testacé pâle, brillant, dessous un peu plus clair. Épistome séparé du front par une forte carène interrompue en son milieu. Tète et corselet à granulations médiocres, espacées. Corselet avec un court sillon à la partie postérieure. Écusson un peu plus long que large, pointu à l'extrémité, faiblement granuleux. Élytres à stries ponctuées, intervalles portant deux rangs de granules espacés. Corselet et élytres glabres ; angle apical avancé en forme de dent ; carène du propygidium interrompue au milieu. Dessous et fémurs à villosité assez longue, peu serrée. Dents des tibias antérieurs grandes, aciculées.

Un exemplaire (ma collection) étiqueté : Obock (?), mais dont il m'est impossible de garantir la provenance.

Orphnus convexus, n. sp. — Long. 6 mill. Noir, brillant, convexe. Tête à ponctuation fine et superficielle; corne céphalique de longueur normale. Corselet à ponctuation médiocre, un peu espacée, régulière sur toute la surface, cavité triangulaire, profonde, saillies latérales non relevées en lames, mais fortement arrondies, à dent prolongée en avant, un peu relevée à l'extrémité. Écusson, lisse, arrondi au bout. Élytres convexes, ponctués comme le corselet, aucune strie, sauf la suturale, bien marquée en arrière, effacée en avant. Dessous, fémurs et tibias brun de poix, tarses noirs.

Fort Crampel. — Un ♂ de développement moyen.

Orphnus compressicornis, n. sp. — Long. 8 mill. Brillant, noir de poix, dessous et pygidium brun-rouge, tibias et tarses plus foncés. Tête lisse, vertex convexe. Épistome fortement bisinué; corne céphalique naissant sur l'épistome, non conique, parallèle dans toute sa longueur, comprimée transversalement, tronquée légèrement, arrondie à l'extrémité. Corselet à ponctuation forte, très éparse, cavité médiane profonde, élévations latérales à extrémités un peu comprimées et arrondies. Écusson brillant, lisse. Élytres à lignes irrégulières de gros points, un peu creusées en stries, ponctuation forte, distante, plus rapprochée autour de l'écusson; intervalles subconvexes, lisses; calus huméral bien saillant; strie suturale profonde.

Manow (Est-Africain Allemand). — Un exemplaire ♂ (ma collection).

Description de deux espèces nouvelles du genre *Rhomborrhina* [Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin

Rhomborrhina Vitalisi, n. sp. — *Laete viridi-aurata; fronte inter oculos sat grosse punctata, clypeo densissime et minute punctato; thorace medio subtilissime punctato, ad latera nigro-strigillato; elytris leviter bicostatis, sat fortiter punctatis, apice striolato. Pectore subtus, abdomine lateribus, femoribus et tibiis dense fulvo-pilosis; processu mesosterni sparsissime punctato, acuminato; tibiis anticis maris gracilibus, feminae extus bidentatis, fortiter dilatatis.*